

## PRODUKTINFORMATION

### derbymed® ToxBlock

Ergänzungsfuttermittel für Pferde in der Form von granulierten Perlen - mit Kräutern und Bentonit

#### 1. Zusammensetzung

Hefenerzeugnisse [Bierhefe], Algen (*Spirulina platensis*), Erzeugnisse aus der Verarbeitung von Kräutern (Oregano 1,4 %, Kamille 0,6 %, Rosmarin 0,5 %), Erzeugnisse aus der Verarbeitung von Pflanzen (Anis 0,3 %, Fenchel), Erzeugnisse aus der Verarbeitung von Gewürzen und Würzmitteln (Zimt), Stärke (Mais), Stärke (Weizen), Zichorienpülpe getrocknet, Natriumchlorid

##### Analytische Bestandteile:

Rohprotein.....	5,0 %
Rohfaser.....	0,3 %
Rohfett.....	1,0 %
Rohasche.....	7,0 %
Calcium.....	0,2 %
Natrium.....	0,3 %
Phosphor.....	0,1 %

##### Zusatzstoffe je kg:

###### *Technologische Zusatzstoffe:*

- *Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe:*

Bentonit (1m558i).....	162 g
Kieselgur (Diatomeenerde, gereinigt) (E 551c).....	26 g
Kieselsäure, gefällt und getrocknet (E 551a).....	4,8 g

- *Konservierungsmittel:*

Calciumpropionat (1a282).....	0,04 g
Zitronensäure (1a330).....	0,03 g
Sorbinsäure (1a200).....	0,01 g

###### *Sensorische Zusatzstoffe:*

Mischung aus Aromastoffen

#### 2. Beschreibung

derbymed® ToxBlock stellt Bentonit in großer Menge zur Verfügung. Bentonit ist ein Bindemittel und aus der Fütterung aller Nutztiere bekannt.

derbymed® ToxBlock zeichnet sich durch sein Adsorptionsvermögen aus. Das Pferd nimmt mit dem Rau- und Kraffutter immer auch untoxische Mengen an Schadstoffen auf. Durch Adhäsion an den Bestandteilen von derbymed® ToxBlock kann die Ausscheidung mit dem Kot unterstützt werden.

derbymed® ToxBlock enthält 5 % Biolex MB40. Biolex MB40 zeichnet sich durch einen Anteil von ca. 20 % Mannan-Oligosacchariden (MOS) und 25 % Glukanen aus. Beide Stoffe zählen zu den Präbiotika. Durch spezielle Oberflächenrezeptoren unterstützt es die Adhäsionskraft von derbymed® ToxBlock



# LIVISTO

### 3. Fütterungsempfehlung

Pferd (600 kg KG): 50 g/Tag

Pony: 25 g/Tag

Zwischen einer Medikamentengabe und der Fütterung von *derbymed*<sup>®</sup> ToxBLOCK sollten mindestens 6 Stunden liegen. Wir empfehlen Rücksprache mit dem Tierarzt zu halten.

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.

Aufgrund des im Vergleich zum Alleinfuttermittel erhöhten Bentonitgehaltes sollte dieses Ergänzungsfuttermittel nur bis zu 10 % der Tagesration verabreicht werden.

### 4. Packungsgrößen

1,5 kg

### 5. Karenzzeit der Rezeptur nach ADMR

48 Stunden

### 6. Stand der Information

02/2026

LIVISTO